

21-22 Dicembre 2020

XXVIII Congresso Nazionale

SICOB ONLINE

Presidenti: P. Gentileschi, A. Giovanelli, M.G.
Carbonelli, F. Micanti



Società Italiana di Chirurgia dell'OBesità
e delle malattie metaboliche

IL PERCORSO DEL PAZIENTE CANDIDATO A CHIRURGIA BARIATRICA DURANTE LA PANDEMIA DA COVID-19

Gemelli



M. R. Magurano, E. Rellini*, B. Aquilanti**, D. Chieffo*, G. Mingrone***, M. Raffaelli*****

** U.O.S di Psicologia Clinica ** U.O.C. Nutrizione Clinica *** U.O.C. Patologie dell'Obesità **** U.O.C. di Chirurgia Endocrina e Metabolica*

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore

OBIETTIVI: Osservazione stato emotivo e comportamento alimentare con valutazione dell'impatto del lockdown in un gruppo di pazienti che aveva iniziato il percorso di chirurgia bariatrica prima dell'emergenza, continuandolo a distanza e completandolo con l'intervento chirurgico durante la fase due.

METODO:

Campione: 25 pazienti (19 Femmine – 6 Maschi – età media 43 anni)
11 seguiti dallo psicologo – 14 non seguiti dallo psicologo

Strumenti: Colloqui e Test Psicodiagnostici – Intervista semistrutturata


METODO:

Procedura: Tutti i pazienti che avevano completato gli esami prima dell'emergenza e in attesa di visita multidisciplinare, compresi quelli che stavano seguendo un percorso di Psicoterapia, sono stati contattati telefonicamente per verificare la loro disponibilità a continuare il percorso a distanza.

Dopo la visita multidisciplinare, a distanza, sono stati rivalutati mediante risomministrazione di alcuni test e intervista telefonica costruita ad hoc.


Variabili indagate: Stato emotivo – Comportamento alimentare

CLINICAL OUTCOMES IN ROUTINE EVALUATION (CORE-OM)




CLINICAL OUTCOMES IN ROUTINE EVALUATION (CORE-OM)

Pazienti = 25 (intero campione)




CLINICAL OUTCOMES IN ROUTINE EVALUATION (CORE-OM)

Pazienti = 14 (non seguiti dallo psicologo)




CLINICAL OUTCOMES IN ROUTINE EVALUATION (CORE-OM)

Pazienti = 11 (seguiti dallo psicologo)




EATING DISORDER EXAMINATION QUESTIONNAIRE (EDE-Q 6)




EATING DISORDER EXAMINATION QUESTIONNAIRE (EDE-Q 6)

Pazienti = 25 (intero gruppo)




EATING DISORDER EXAMINATION QUESTIONNAIRE (EDE-Q 6)

Pazienti = 11 (seguiti dallo psicologo)




EATING DISORDER EXAMINATION QUESTIONNAIRE (EDE-Q 6)

Pazienti = 14 (non seguiti dallo psicologo)



Risposte all'intervista



Conclusioni

In condizioni critiche come l'attuale emergenza sanitaria la presa in carico multidisciplinare e la continuità terapeutica di un percorso a distanza possono contenere, ed in alcuni casi migliorare:

- aspetti emotivi
- comportamento alimentare disfunzionale

I nostri risultati forniscono un ulteriore contributo per:

➤ la comprensione delle problematiche psicologiche derivanti dagli effetti diretti e indiretti della pandemia da Covid-19 in pazienti bariatrici e spunti di riflessione sulle opportunità della telemedicina.

Grazie per l'attenzione!