ISMETT *Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere
Scientifico*

UPMC **LIFE
CHANGING
MEDICINE**

La gestione delle complicanze bariatriche: come scegliere la strategia di intervento.

Antonino Granata
Endoscopy Unit
Department of Diagnostic and Therapeutic Services
ISMETT - UPMC
Palermo

#intro

- Chirurgia dell'obesità: incremento del numero di interventi con incidenza di complicanze in progressivo aumento.
- Complicanze chirurgiche post-bariatriche (sanguinamenti, leaks e stenosi): 10 - 13 % dei casi.
- Fattori di rischio:
 - età
 - ASA score
 - sesso maschile
 - chirurgia open
 - **revisione chirurgica**
 - BMI >50.

Christophorou D et al. Endoscopic treatment of fistula after sleeve gastrectomy: results of a multicenter retrospective study. *Endoscopy*. Nov 2015.

Teak_post_sleeve

- vascolare
 - ridotta perfusione nel tubulo gastrico
- meccanica:
 - alta pressione sul versante prossimale della sutura
 - angolo troppo acuto del tubulo gastrico
 - substenosi del tubulo gastrico

Il goal del trattamento non è guarire, ma promuovere i meccanismi riparativi che portano alla guarigione del tessuto nel minor tempo possibile

I principali fattori da gestire sono:

- nutrizione
- differenza di pressione endo, extra-luminale
- trofismo tissutale
- infezione

Proposed therapeutic algorithm. Percutaneous drainage should be preferred especially in case of Large size (> 5 cm) or infected collections, delayed endoscopic treatment or referred late (> 30 days), first endoscopic treatment in unspecialized hospital, gastro-bronchial fistula, easy radiologic access. *FC-SEMS* fully covered self-expandable metal stent, *EID* endoscopic internal drainage, *ET* endoscopic therapy

#doppio_pigtail

#solo_sutura

#full_treatment

sutura + necrosectomia + fc-sems (ancorato) + taglio sutura + rimozione stent

#which_stent?

Fit for lumen:

- As small as possible
- As short as possible

Remove:

- as soon as possible
- **Less is more!**

- rialimentazione precoce sicura
- antibioticoterapia (infettivologo)
- tempismo nella gestione dei drenaggi chirurgici e/o percutanei → rimozione precoce sicura (valutazione radiologica e clinica)
- mantenere in sede i dispositivi protesici meno possibile 2-4 settimane → rimozione precoce sicura (valutazione radiologica e clinica)

#septotomy #endoluminal_surgery

Teamwork? Mandatory!

NOSTRA STRATEGIA

Multispecialty

Clinica e Radiologia

Percutaneous/
Surgical
Drainage vs
EID

NETWORK

Tissue
Evaluation

Follow-up

TIMING